

突発性難聴（急性感音性難聴）

< どんな病気？ >

突然、耳が聞こえなくなる病気です。

中耳炎や外耳炎・外傷ではなく、内耳にある聞こえの神経（聴神経もしくは、蝸牛神経ともいいます）の障害によるものです。

たいてい片方の耳だけですが、ほんのまれに両耳のこともあります。

< 原因は？ >

ほとんどの場合、原因不明です。

ただし、ウイルスが原因となることもあります。

小児の場合、おたふくウイルスなどに合併することがあります。

< どうして聞こえなくなるの？ >

前述したように原因は、不明ですが、内耳をとりまく微小血管の血液環境の障害や、内耳神経浮腫などが、考えられます。

< 治療は？ >

できるだけ早い時期に、血液の流れを改善します。

具体的には、血液循環改善剤を中心とした点滴や内耳神経浮腫を取り除くステロイド剤およびビタミン剤などを使用します。点滴は、原則、毎日です。

1～2回／週の聴力検査にて経過を見ていきます。

おおよそ1～2週間の予定です。その間できるだけ安静を保ってください。

入院ご希望の方は、お申し出下さい。

< 治療効果は？ >

個人差もありますが、短期に完全治癒することも、なかなか改善のみられないこともあります。低音部のみが、軽度から中等度に低下している例は比較的治りやすいので、内服剤のみで、治療していくこともあります。

全音域が、高度に低下している例は、治療期間がかかることが多いです。

ただし、治療は、できるだけ早期の方が、改善率は、よいようです。

治療効果をみるために聴力検査をこまめに行い、患者さんに報告していきます。

※ 御質問があれば、遠慮せずにご相談下さい。

はなみ会HP

<http://hanamikai.com>

